

عنوان:

بررسی امید به زندگی و متوسط سال های از دست رفته زندگی در مبتلایان به HIV تحت پوشش مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهر بندرعباس

استاد راهنما:

دکتر محسن رضائیان

پژوهش و نگارش:

سحر پیکانی

خرداد ۹۷

چکیده

مقدمه: برای مدیریت یک مشکل، دانستن اندازه جمعیت مرتبط با آن مشکل بسیار اهمیت دارد. در این مطالعه برای برآورد اندازه جمعیت دارای رفتارهای پرخطر در رفسنجان از روش بسط شبکه ای که یکی از روش های غیر مستقیم تخمین اندازه جمعیت است، استفاده شده است.

روش اجرا: با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای با ۴۳۱ نفر از دانشجویان گروه هدف مصاحبه و پرسشنامه استاندارد مورد نظر تکمیل گردید. به منظور تخمین اندازه شبکه اجتماعی (C) به روش مستقیم شش سوال در پرسشنامه در نظر گرفته شد. برای برآورد اندازه گروههای دارای رفتارهای پرخطر از رویکرد فراوانی روش Network Scale Up استفاده گردید. برای تطبیق خطاهای رایج در این روش ضرایب تصحیح مربوطه به کار گرفته شد.

یافته ها: با بکار گرفتن روش حداکثر بزرگنمایی اندازه شبکه اجتماعی (C) محاسبه شد. متوسط C برای مردان $26/71 \pm$ و $25/70$ و برای زنان $23/57 \pm$ و $24/35$ محاسبه شد. بر اساس گزارش دانشجویان مونث دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شیوع مصرف الکل در بین دانشجویان زن $1/80$ درصد، و در بین دانشجویان مرد $3/97$ درصد برآورد گردید. شیوع تماس جنسی خارج از ازدواج در بین دانشجویان زن $1/2$ درصد و در بین دانشجویان مرد $4/27$ درصد محاسبه شد. براساس گزارش دانشجویان مذکر دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شیوع مصرف الکل در بین دانشجویان زن $3/67$ درصد، و در بین دانشجویان مرد $37/04$ درصد برآورد گردید. شیوع تماس جنسی خارج از ازدواج در بین دانشجویان زن $14/39$ درصد و در بین دانشجویان مرد $17/87$ درصد محاسبه شد.

نتیجه گیری: رفتارهای پر خطر در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است. این رفتارها در مردان نسبت به زنان شیوع بالاتری داشته است. همچنین روش غیرمستقیم بسط شبکه ای نسبت به روش مستقیم شیوع بالاتر و دقیقتری برای تمام رفتارهای پرخطر برآورد نموده است.

واژگان کلیدی: بسط شبکه ای، رفتارهای پر خطر، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان